

HEPATİTLƏR

Hepatit – qaraciyərin kəskin və xroniki iltihabıdır. Bu proses nəinki qaraciyəri, həm də insanın başqa orqan və sistemlərini zədələyən virus vasitəsiylə törənir. Hepatit tədricən inkişaf edərək qaraciyər çatışmazlığına gətirib çıxara bilər.

Hepatit yer üzündə ən çox yayılmış xəstəliklərdəndir və ancaq canlı hüceyrələrdə artıq bilən viruslar əmələ gətirir.

Hansı virusla törəməsindən aslı olaraq hepatitin bir çox növü vardır: **A, B, C, D, E, F, G** (Axırıncı üç növə nadir hallarda rast gəlinir).

Əlamətləri

- Ürək bulanması, qusma, ishal,
- Şiddətli iştahsızlıq,
- Mədə – bağırsaq şikayətləri,
- Qarnın üst bölgəsində ağrı,
- Yorgunluq.

Təkcə Hepatit – A-da 38 C yüksək temperaturla yanaşı (influenzadakı kimi) oynaq ağrıları da əmələ gəlir.

Temperatur, ümumiyyətlə sarılığın ilk bir neçə günündə normala dönür.

Virial Hepatitlərdəki ən tipik ifadə olunan:

- Göz ağının, dəri və mukoz membranların saralması,
- Sidiyin rənginin tündləşməsi,
- Nəcisin rənginin açılmasıdır. Xəstəliyin başlanğıcından 2 – 3 həftə sonra nəcisin rəngi normala dönər. Bir və ya iki həftə sonra qaraciyər böyüyə bilər və sarılıq görülə bilər.

YOLUXMA SƏBƏBLƏRİ

Virus bədənə ümumiyyətlə ağız yoluyla, xüsusilə yemək və içkilərlə girər. Bu vəziyyət, kəslərin tualetə getdikdən sonra əllərini yumması və çirkli əlləriylə sağlam kəslərin yeməklərinə toxunması ilə də meydana gələr. Hepatit virusuyla yoluxmuş suların içilməsi, bu sulardan çıxarılan buzların istifadə edilməsi ən böyük yoluxma mənbəyidir. Ölkəmizdə, kəndlərdə tualetlər ümumiyyətlə çöldədir və meyvə-tərəvəzlərin yetişdirildiyi yerlərə yaxındır. Gübrə olaraq torpağa axıtılan Hepatit-A virusu ilə yoluxmuş suvarma suları, çiy yeyilən kəpik, cəfəri, təzə soğan, və başqa bu kimi yaşıllıqlara və tərəvəzlərə bulaşmaqda və bu çirkli yaşıllıqların kifayət qədər təmizlənmə bilməməsi də böyük yoluxmalara səbəb olmaqdadır. Müşahidələrə görə

bütün restoranlarda hazırlanan salatların tərəvəzləri və guya yuyunmuş olaraq gətirilən kahı-cəfəri və başqa göyərtilər əlbəttə ki, bir ləyən və ya vedrədəki suya batırılıb çıxarılmaqla təmiz olması mümkün olmadığı halda (!) süfrələrimizə gətirilməkdədir. İfrağatla çirklənən sulardan toplanan göyərtilər, tərəvəzlər və qabıqlı dəniz məhsullarının yeyilməsi, xüsusilə payız və qış aylarında epidemiyalara səbəb olmaqdadır. Hepatit A xəstəliyi keçirən adam ilə yaxın təmas və cinsi əlaqə də xəstəliyin yayılmasına səbəb olur.

XƏSTƏLİKDƏN QORUNMA TƏDBİRLƏRİ

Xalqın fərdi gigiyena, əllərin tez-tez yuyunması, və tullantıların sağlam uzaqlaşdırılması qaydaların riayət etməsi,

- Sağlam içmə və istifadə etmə sununun təmini ilə,
- Kafi kanalizasiya sistemlərinin təmiri,
- Yoluxma ehtimalı olan qidanların kifayət qədər yuyunması və bişirilməsiylə,
- Bakterioloji idarə olunmayan içmə sularının qaynadılmasıyla,

- Uşaq bađçalarında işləyən personala və yaşayanlara lazımlı təhsilin verilməsilə xəstəliyin qarşısı alınır.

Gigiyena və sağlamlıq qaydalarına riayət etmək, yoluxma riskini azalda bilər ancaq tamamilə maneə törədə bilməz.